

Review

Violence against Emergency Nurses and some related factors

Ravanbakhsh Esmaeili^{1*}, Alireza Lameh Jouybari²

1. Associate Prof., Orthopedic Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.

2. Msc student in emergency nursing, Nasibeh School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

*. Corresponding Author: E-mail: r.esmaeili@mazums.ac.ir

(Received 12 December 2019; Accepted 7 April 2020)

Abstract

Violence against nurses is one of the growing problems around the world. One of the concerns of health workers is violence at work, which is one of the effective factors in decreasing the working quality and satisfaction of staff and patients. The emergency department, because of its working nature is an environment full of violence and can easily turn to a place for violent behavior. The purpose of this study was to systematically investigate the determination of violence against emergency nurses.

This study is a narrative review that searches through databases, Google Scholar, PubMed, SCOPUS, Scientific Jihad Scientific Database (SID), Magiran (Bank of journals of the country). Criteria's for articles entry included: researches related to emergency nurses, publishing article in Persian or English, the accessibility to the article's full text. Finally, 15 articles were selected for the purpose of the research. The findings were categorized into 8 main categories, violent characteristics, nurses characteristics, nurses reactions to violence, Reporting rates and reasons for not reporting, violet's characteristics, Problems that cause violence, Legal dimensions of violence, Violence reduction strategies.

Most of the violence against nurses is verbal and then physical; sexual and racial violence have been studied in a few studies. The concerning matter is the low rate of reporting and follow-up after violence which needs to be mitigated by planning and policy.

Keywords: Violence, Nurse, Emergency, Aggression, Bullying.

ClinExc 2020; 9(34-44): In Press (Persian).

خشونت علیه پرستاران اورژانس و برخی عوامل مرتبط با آن

روانبخشن اسماعیلی^{*}، علیرضا لامع جوباری[‡]

چکیده

خشونت علیه پرستاران یکی از مشکلات در حال افزایش در سراسر دنیا می‌باشد. یکی از نگرانی‌های کارکنان بهداشت و درمان خشونت محل کار می‌باشد که یکی از عوامل مؤثر در کاهش کیفیت کاری و میزان رضایتمندی کارکنان و بیماران است، بخش اورژانس به لحاظ طبیعت کاری، محیطی پربرخورد است و بهسادگی می‌تواند به محلی جهت بروز رفوارهای خشونت‌آمیز تبدیل گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستماتیک تعیین خشونت علیه پرستاران اورژانس طراحی و اجرا شد.

این مطالعه به صورت مروری نقلی بوده که جستجو از طریق پایگاه‌های SCOPUS، PubMed، Google Scholar، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، بانک نشریات کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی انجام شد. معیارهای ورود مقالات شامل: پژوهش مرتبط با پرستار اورژانس، انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی، امکان دسترسی به متن کامل مقالات. نتایج: در نهایت ۱۵ مقاله در راستای اهداف پژوهش برگزیده شد. یافته‌ها به ۸ دسته اصلی؛ ویژگی‌های خشونت، ویژگی‌های پرستاران، واکنش پرستاران به خشونت، میزان گزارش دهی و دلایل عدم گزارش دهی، ویژگی‌های خشونت کننده، مشکلاتی که خشونت به وجود می‌آورد، ابعاد قانونی خشونت، راه‌کارهای کاهش خشونت تقسیم‌بندی شدند. بیشترین خشونت رخ داده علیه پرستاران از نوع خشونت کلامی و سپس فیزیکی می‌باشد؛ خشونت جنسی و نژادی در مطالعات کمی بررسی شده‌اند. موضوع نگران کننده میزان پایین گزارش دهی و پیگیری‌های پس از وقوع خشونت می‌باشد که لازم است با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از وقوع آن کاست.

واژه‌های کلیدی: خشونت، اورژانس، پرستار، پرخاشگری، نزع.

مقدمه

بدرفتاری، تهدید یا آزار و اذیت قرار گیرد به شکلی که سلامت، رفاه و ایمنی آن تحت تأثیر قرار گیرد (۲-۳). سازمان بهداشت جهانی، خشونت محل کار را استفاده آگاهانه از نیروی فیزیکی، به شکل تهدید یا واقعی، علیه خود، فرد یا گروه دیگر یا جامعه اطلاق می‌کند که می‌تواند به آسیب، صدمات و حتی مرگ بیانجامد (۴-۶).

خشونت رفتاری است که طی آن فرد با استفاده از توان فیزیکی و یا غیر فیزیکی در صدد تحمل خواسته‌های خود به دیگران برمی‌آید (۱). خشونتی که در محیط‌های کاری رخ می‌دهد به عنوان خشونت محل کار نامیده می‌شود و موقعیتی است که در آن فرد به دلیل شرایط کاری خود مورد سوءاستفاده،

۱. دانشیار، مرکز تحقیقات ارتودوکسی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

۲. دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

* نویسنده مسئول: مازندران، ساری، خیابان وصال شیرازی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، گروه آموخت داخلي-جراحي.

** تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۹/۲۱ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۱۵

کارکنان دارند بعلاوه سوءصرف مواد و مشکلات روانی می‌تواند احتمال بروز خشونت در اورژانس را افزایش دهد (۲۲-۲۳).

علیرغم شناس بالای بخش اورژانس جهت بروز خشونت در آن متأسفانه اهمیت موضوع هنوز به خوبی شناخته نشده است (۲۴-۲۵) و کمتر مطالعه جامعی در خصوص میزان بروز خشونت و علل و عوامل ایجاد کننده آن و راه حل های پیشگیری از آن که مختص به پرستاران این بخش باشد صورت گرفته است لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی خشونت علیه پرستاران اورژانس و برخی عوامل مرتبط با آن طراحی و اجرا گردید.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر از نوع مروری نقلی در زمینه خشونت علیه پرستاران اورژانس می‌باشد. کلیه مقالات فارسی و انگلیسی منتشر در داخل و خارج از کشور بدون محدودیت زمانی مورد بررسی قرار گرفت.

جستجو از طریق پایگاه‌های Google Scholar، PubMed، SCOPUS، Dانشگاهی (SID) بانک نشریات کشور (Magiran)، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (SID) بانک نشریات کشور (Magiran)، کلیدواژه‌های مورد بررسی شامل صورت پذیرفت، کلیدواژه‌های مورد بررسی شامل خشونت، اورژانس، پرستار، پرخاشگری، نزاع برای مطالعات فارسی زبان و برای مطالعات انگلیسی از کلیدواژه‌های Violence، Nurse، Emergency، Aggression، Bullying و ترکیب آنان بود.

معیارهای ورود مقالات شامل: پژوهش مرتبط با پرستار اورژانس، انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی، امکان دسترسی به متن کامل مقالات. ضمناً محدودیتی جهت ورود مطالعات براساس طراحی مطالعات انجام شده وجود نداشت. مقالاتی که به بررسی گروه‌های پژوهشکی و کارکنان بهداشت و درمان نیز پرداخته بودند یا در بخش‌هایی غیر از اورژانس نیز انجام شده بودند به دلیل عدم امکان جداسازی نتایج مربوط به پرستاران اورژانس از مطالعه خارج شدند.

خشونت محل کار یکی از عوامل مؤثر در کاهش کیفیت کاری و میزان رضایتمندی کارکنان و بیماران است (۷-۱۰).

اگرچه خشونت در درجه اول پرستاران را مورد هدف و آسیب قرار می‌دهد اما قیانی نهایی آن بیماران هستند (۱۱). تحقیقات نشان می‌دهد خشونت باعث افزایش مسائلی مانند استرس، اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب و بی‌قراری می‌شود و در سطح سازمانی نیز منجر به کاهش کیفیت و کارایی پرستار و افزایش غیبت می‌گردد (۱۲-۱۳).

در مطالعات انجام شده در زمینه خشونت محل کار بر این نکته تأکید شده است که بهبود محل کار و شرایط کاری کارکنان بهداشت و درمان از ارکان ضروری سیستم‌های بهداشتی-درمانی محسوب می‌شود (۱۴).

خشونت علیه پرستاران یک مشکل جهانی و رو به افزایش در تمامی کشورها و ایران می‌باشد (۱۵-۱۷)، علیرغم بالا بودن آمار خشونت علیه کلیه کارکنان درمانی، تحقیقات نشان داده است که شیوع آن علیه پرستاران بیش از دیگر کارکنان می‌باشد (۱۸).

بیش از نیمی از پرستاران در بسیاری از کشورهای اروپایی در طول یک سال کاری خود در معرض یکی از انواع خشونت محل قرار می‌گیرند (۱۹).

میزان خشونت در نقاط مختلف دنیا از ۷۶ درصد در یونان، ۸۲ درصد در پاکستان و ۶۷ درصد در ایتالیا متفاوت می‌باشد (۱۱). در ایران نیز در مطالعه سلیمی و اعزازی ۹۷/۸ درصد پرستاران تجربه خشونت کلامی و ۵۴/۱۳ درصد تجربه خشونت فیزیکی را داشته‌اند (۲۰).

بخش اورژانس به دلیل ماهیت آن، محیطی پر تنش و استرس‌زا می‌باشد و به سادگی می‌تواند محلی جهت بروز رفتارهای خشونت‌آمیز گردد (۲۱، ۱۲). میزان فشار عصبی و استرس بالای بخش اورژانس، احتمال وقوع خشونت علیه پرستاران را افزایش می‌دهد (۱). شرایطی که بر اورژانس حاکم است از جمله ورود بدون محدودیت بیماران و همراهان آن‌ها، زمان طولانی انتظار و استرس بالا در مورد شرایط خاصی که مراجعه کنندگان و

تعطیل(۲۸-۲۹،۲۶) و هنگام پذیرش بیمار(۳۰) و بیشترین مکان وقوع خشونت در ایستگاه پرستاری و سپس در اتاق و بر بالین بیمار و نیز در درمانگاه می باشد(۱). (۳۰).

ج) دلایل وقوع خشونت

- از شایع ترین دلایل وقوع خشونت می توان انتظار طولانی مدت جهت دریافت خدمات سلامت، در دسترس نبودن کارکنان اداری جهت پذیرش و ترخیص به موقع، اختلالات روانی و مصرف الکل، بالا بودن هزینه ها و عدم پوشش کافی بیمه ها، کم بودن کارکنان به نسبت مراجعین، نبود نیرو های امنیتی ثابت، دسترسی آزاد به بخش اورژانس، ارتباطات ناموثر، شرایط بیماران و بستگان، عدم رسیدن به موقع بر بالین بیماران و کمبود مهارت و تجربه کارکنان را نام برده(۱-۲،۲۸-۳۳).

۲) ویژگی پرستاران

بروز خشونت علیه پرستاران مرد بیشتر از پرستاران زن می باشد اما میان سایر خصوصیات مانند سن، سابقه، تحصیلات و... رابطه معنی داری مشاهده نشد(۱-۲، ۱۲، ۳۴-۳۵، ۳۲، ۲۷).

۳) واکنش به خشونت

از واکنش های پرستاران به خشونت می توان به احساس ناراحتی، ترس و اضطراب، ترک صحنه، نشان ندادن عکس العمل، نادیده گرفتن خشونت، گزارش خشونت رخداده، رفتار محاطانه، دعوت به آرامش، اطلاع به پلیس و موفق، صحبت با همکار، خانواده و دوستان، تلاش برای دفاع فیزیکی و شکایت اشاره کرد بسیاری موارد پرستاران معتقدند خشونت جزئی از کار آن هاست(۲، ۲۸-۲۹، ۳۴-۳۳).

یافته ها

به طور کلی ۲۶ مقاله با توجه به موضوع و زمینه پژوهش یافت شد، ۲ مقاله به دلیل زبان های غیر از فارسی و انگلیسی، ۲ مقاله به دلیل عدم دسترسی به متن کامل و ۷ مقاله به دلیل تکراری بودن حذف گردید که در نهایت ۱۵ مقاله مورد بررسی قرار گرفت. از میان مقالات ۹ مقاله در مجلات خارجی و ۶ مقاله در مقالات داخلی به چاپ رسیده است. ۶ مقاله از مقالات اصلی پژوهشی بودند. در میان مطالعات تنها یک مطالعه به صورت مداخله ای انجام گرفت.

نتایج حاصل از استخراج یافته های مقالات را می توان به ۸ دسته اصلی ویژگی های خشونت، ویژگی های پرستاران، واکنش پرستاران به خشونت، میزان گزارش دهی و دلایل عدم گزارش دهی، ویژگی های خشونت کننده، مشکلاتی که خشونت به وجود می آورد، ابعاد قانونی خشونت، راه کارهای کاهش خشونت تقسیم بندی کرد.

۱) ویژگی های خشونت:

که خود نیز به دسته های زیر تقسیم می شود:

الف) فراوانی خشونت:

بیشترین نوع خشونت رخداده از نوع کلامی می باشد که شیوع آن بین ۵۹/۷۸-۹۷/۸ گزارش شده است همچنین با عنایتی مانند خشونت لفظی ۵۸/۶۴ درصد و تهدید بین ۳۰/۲۴-۸۰/۶ درصد گزارش شده است. خشونت فیزیکی بین ۱۰-۵۴/۳ درصد گزارش شده است. رفتار تهاجمی تحقیرآمیز ۴۷/۲ درصد و تخریب ۴۵/۷ درصد گزارش شده است. شیوع خشونت جنسی بین ۱۵/۲۱ درصد و خشونت نژادی درصد بود.

ب) مکان و زمان وقوع خشونت

بیشترین زمان وقوع خشونت در شب شنبه (۲، ۱۲، ۲۶-۲۸)، آخر هفته و روزهای

۱) رفتار و خشونت جسمی محیط کار بسیار نگران کننده هستند(۱).

بیشتر افرادی که مورد خشونت قرار می‌گیرند نگران وقوع مجدد آن هستند. این نگرانی که شاید ناشی از کاهش اعتماد به نفس فرد در اثر مواجهه مکرر باشد می‌تواند منجر به کاهش رضایت شغلی، احساس سلامت و کاهش کیفیت ارتباط بین بیمار و کارکنان درمانی شود(۳۱).

۲) ابعاد قانونی خشونت

سیستم‌های قانونی مشخصی در رابطه با خشونت محل کار وجود ندارد و اکثر موارد گزارش شده نیز بدون پیگیری باقی می‌ماند. بنابراین کارکنان دلیلی برای گزارش دهی نمی‌بینند زیرا نتیجه‌ای ندارد و مشکل همچنان باقی است. همچنین به نظر می‌رسد مسئولین بیمارستان در این موارد غالباً سکوت و بی‌تفاوتوی را ترجیح می‌دهند. بنابراین اگرچه اغلب پرستاران اقدامات قانونی را در این موارد حق خود می‌دانند، به دلیل بی‌نتیجه بودن و زمان بر بودن آن از پیگیری صرف نظر کرده و تلاش می‌کنند آن را فراموش کنند(۱)،(۳۱). افزایش حمایت‌های مناسب و کافی از سوی مسئولین بیمارستانی و اتخاذ تدبیری برای رسیدگی قانونی به موارد بروز خشونت و پیگیری آن، روحیه کارکنان ارتقا می‌آید، کیفیت خدمات بهبود پیدا می‌کند و در درازمدت سبب کاهش بروز خشونت شغلی می‌شود(۳۱).

۳) راه‌کارهای کاهش خشونت

خشونت‌های به وجود آمده علیه پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس بیمارستانی زنگ هشداری برای مسئولان ذی‌ربط می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی و دستورالعمل‌های مدون در خصوص نحوه برخورد با خشونت علیه پرستاران مخصوصاً آموزش به پرستاران تازه‌وارد، آموزش مهارت‌های ارتباطی و کنترل خشونت به دانشجویان پرستاری(۱)،(۳۱)، بهبود قوانین و آینین‌نامه‌ها، توجه بیشتر

۴) گزارش دهی و دلایل عدم گزارش دهی

نتیجه مطالعات نشان‌دهنده آن است بیشتر موارد خشونت رخداده گزارش نمی‌شود که از دلایل آن: اعتقاد به بی‌فایده بودن، بی‌اهمیت بودن خشونت رخداده، ترس از تلافی، پذیرفتن خشونت به عنوان جزئی از کار، ناآگاهی در مورد روند گزارش دهی، بی‌تفاوتوی مدیران نسبت به خشونت علیه پرستاران و خجالت اشاره کرد در یک مورداشاره شد سازمان پروسه‌ای جهت گزارش دهی ندارد. در مطالعات انجام شده رضایتمندی پرستاران از پیگیری‌های انجام شده پس از گزارش دهی بین ۴-۵ درصد بود(۲،۱۲،۲۶-۲۹،۳۱،۳۳-۳۴).

۵) ویژگی‌های خشونت کننده

براساس مطالعات انجام شده ۴۰/۴-۷۳/۸ درصد خشونت توسط همراهان بیمار می‌باشد. اکثربیت خشونت کننده‌گان در بازه سنی ۱۶-۴۰ سال قرار دارند. بیشتر افرادی که پس از مراجعه به اورژانس منجر به ایجاد خشونت توسط خود و همراهان شدند دچار سوءصرف الکل و مواد مخدر، ترومما، اختلالات روانی، اقدام به خودکشی و ضرب و جرح بودند(۲،۱۲،۲۶-۳۲،۳۴-۳۵).

۶) مشکلاتی که خشونت به وجود می‌آورد

مطابق پژوهش‌های انجام شده، مشکلاتی که مواجهه با خشونت برای پرستاران به وجود می‌آورد شامل: ناراحتی، اضطراب و ترس، درمانگی و احساس حقارت، خشم و تنفر، تحلیل رفتان قدرت جسمانی و روانی و استرس حاد می‌باشد. در مطالعه دیگری بازنیشتیگی زودتر از موعد نیز از عواقب خشونت ذکر شده است(۲).

عوامل مؤثر در تشدید تنفس در حرفه‌ی پرستاری که باید مورد توجه قرار گیرند از جمله ساعت کاری زیاد، شیفت در گردش، تعارضات بین فردی، کمبود منابع، کمبود پاداش و قدردانی از پرستاران و همچنین سوء

شرم و بی‌پناهی، ترس از سرزنش موفق باید همواره مدنظر باشد. گاهی ممکن است موقتاً لازم باشد که آن کارمند به محل کار قبل خود برنگردد تا در تماس مجدد با مرتكبین یا محیط استرس‌زا قرار نگیرد.^(۲)

افزایش تعداد کارکنان خصوصاً کارکنان با مجریه، افزایش پوشش بیمه‌ای، محول ننمودن اقدامات حاشیه‌ای مانند تهیه دارو و تجهیزات یا اقدامات پاراکلینیکی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند مؤثر باشد.^(۳۱)

عدم شناخت صحیح جامعه از رشتہ پرستاری و تبلیغات منفی در صداوسیما، جراید و نشریات که گاهی پرستاری را تا سطح مشاغل خدماتی فاقد زمینه حرفه‌ای پایین می‌آورند، منجر به ایجاد خواسته‌ها و مطالبات غیرمعقول و غیرمنطقی می‌کند که فراهم نکردن آن‌ها منجر به ایجاد خشونت می‌شود.^(۳۲)

برای ایمن‌سازی پرستاران در برابر خطرات دانشگاه‌ها و سایر مراکز مرتبط نیز باید مسئولیت‌پذیر باشند و آن‌ها را حمایت کنند زیرا تا زمانی که این مسئله را نپذیریم نمی‌توانیم اقدام مؤثر انجام دهیم.^(۳۳)

در مطالعات انجام‌شده، برخی شرکت‌کنندگان اظهار نمودند که وجود نگهبانان ثابت می‌تواند در کاهش خشونت کمک کننده باشد.^(۲۹)

نتیجه‌گیری

براساس یافته‌های حاصل از این پژوهش و مطالعات انجام‌شده، خشونت یک مشکل بسیار شایع در بخش اورژانس می‌باشد که در حال گسترش است تا جایی که برخی پرستاران آن را به عنوان بخشی از شغل خود پذیرفته‌اند.^(۳۶، ۲۸) در میان انواع خشونت‌های صورت گرفته، خشونت کلامی شیوع بسیار بالایی دارد، گواه آن مطالعاتی است که نشان‌دهنده شیوع بین ۵۹/۷۸-۹۷/۸ درصد می‌باشد. در این راستا در مطالعه عباسی میزان خشونت کلامی ۷۷/۵ درصد^(۲۵)، جونز و همکاران ۹۰ درصد گزارش شده است.^(۳۷) وجود اختلاف میان آمار خشونت علیه پرستاران در نقاط مختلف دنیا می‌تواند ناشی از وجود اختلاف در فرهنگ

مسئولین به این امر و استفاده از رسانه‌ها جمعی برای آموزش همگانی و ارتقاء فرهنگ معاشرت با کارکنان بیمارستان، گامی مؤثر در جهت کاهش این معطل نظام سلامت برداشته شود.^(۳۱، ۲)

استفاده از فرم‌های تدوین شده جهت گزارش خشونت، وجود فرآیندی منسجم برای پیگیری و گزارش دهی پس از وقوع خشونت از دیگر اقداماتی است که ضروری به نظر می‌رسد، در رسیدگی به این گزارش‌ها باید اصل رازداری کارمند و عدم سرزنش و انتقاد از وی مورد توجه بوده و علت خشونت ریشه‌یابی شود تا ز بروز موارد مشابه دیگر، پیشگیری شود.^(۳۱، ۱)

در این زمینه تعیین انواع خشونت، میزان وقوع آن و شناخت راهکارهای موفق در مقابله با خشونت ضروری می‌باشد. همچنین تعیین روش‌های مؤثر مدیریتی، پیشگیری، آموزش، بررسی آموخته‌ها، انگیزش و عملکرد مسئولان سیستم مراقبت در زمینه سلامت در بیمارستان‌ها الزامی است. لذا ایجاد یک محیط حمایتی، منابع کافی، محدود کردن زمان ملاقات، همچنین نظارت و پاسخگویی در مراقبت از بیماران، پیش‌نیازهای اجرای موفقت آمیز برنامه‌های مراقبتی در چنین اموری است. بنابراین ارتقای قوانین و شرح وظایف موجود، افزایش نیروی انسانی و بهبود ارتباط بین بخشی جهت پاسخگویی نیازهای مددجویان و کاهش انواع خشونت الزامی است. جهت پیشبرد سلامت جسمانی و روانی پرستاران و بیماران، ایجاد آرامش، انگیزش و اشتیاق کارکنان درمانی، بهینه کردن محیط شغلی، امکانات و تسهیلات لازم فراهم گردد. فراهم کردن محیط کاری امن، حمایت از کارکنان، استفاده مناسب از مهار و اتفاق‌های ایزوله برای بیماران تهاجمی، مشاوره برای پرستار قربانی، مراقبت طبی یا روانی پرستار قربانی در صورت لزوم از دیگر راه‌های پیشگیری از خشونت می‌باشد.

کارمند نیازمند مراقبت جسمی و روانی است. عواقب روانی خشونت از جمله ترس از بازگشت به کار، تغییر در ارتباط با همکاران و خانواده، احساس بی‌کفایتی

حاکم بر جامعه یا به کارگیری روش‌های مختلف پیشگیری از خشونت مانند فرهنگ‌سازی، آموزش، اصلاح فرایند پذیرش و ترجیح بیماران و برخورد با مهاجمین باشد.

در بسیاری از مطالعات انجام شده به بررسی فراوانی خشونت فیزیکی و کلامی پرداخته‌اند اما خشونت جنسی فقط در ۲ مقاله (۳۵، ۳۶) و خشونت نژادی فقط در یک مقاله مورد بررسی قرار گرفته است (۳۲) که می‌تواند به دلیل ترس و خجالت از گزارش دادن یا فرهنگ حاکم بر جامعه باشد، بررسی محدود این نوع از خشونتها از یک سو و از سوی دیگر گزارش‌دهی پایین پرستاران تا حدود زیادی می‌تواند این خشونتها را ناشناخته بگذارد.

در پژوهش‌های انجام شده عنوان شد تعدادی از پرستاران اورژانس روند گزارش دهی را نمی‌دانند و اینکه سازمان سازوکاری جهت گزارش دهی و پیگرد قانونی ندارد (۲، ۲۸، ۳۴، ۳۶) طی مطالعه ریچاردسون، بسیاری از موارد خشونت رخداده در اورژانس گزارش نمی‌شود (۳۸). همچنین در یک مطالعه عنوان شد ۶۰ درصد پرستارانی که وقوع خشونت را گزارش کردند از پیگیری‌های انجام شده ناراضی‌اند (۳۴). در شرایطی که وقوع خشونت در حال افزایش می‌باشد وجود سازوکاری مشخص جهت گزارش وقوع خشونت و پیگیری موارد خشونت صورت گرفته علیه پرستاران همچنین حمایت پرستاران جهت گزارش ضروری به نظر می‌رسد.

در پژوهش‌های صورت یافته، اکثریت خشونت کنندگان، همراهان بیمار بودند (۲، ۳۰، ۳۲، ۳۴-۳۵) و از سوی یکی از علل وقوع خشونت عدم کنترل آمد و شد در بخش اورژانس و تعداد همراهان می‌باشد (۲۰-۲۸)، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن نگهبانان آموزش‌دیده و ثابت در بخش اورژانس و کنترل رفت و آمد افراد می‌توان تا حدودی از وقوع خشونت در اورژانس کاست. بین ۴/۳۴-۵۶/۶ نرودند که دوره‌های آموزشی را گذرانند (۲، ۱۲، ۲۸-۲۹).

یکی از عوامل سرخوردگی کارکنان این است که احساس کنند پس از گزارش رویداد، هیچ کاری از سوی مدیران برای آن‌ها انجام‌نشده است. مدیران که خود باید نمایانگر رعایت کدهای اخلاقی در مؤسسات باشند، ممکن است نتوانند مورد را پیگیری کنند ولی حداقل باید به کارکنان اطمینان داده و از آن‌ها حمایت کرده و به آن‌ها اطمینان دهنده که گزارش واصله از مسیر صحیح خود در حال پیگیری است (۱). بر اساس مطالعات یکی از عوامل افزاینده خشونت در اورژانس استرس شغلی می‌باشد که با حمایت‌های روانی و برنامه‌های کاهش استرس پرستاران می‌توان از وقوع آن کاست (۴۳-۴۵).

در یک مطالعه انجام شده در شهر رشت، اکثربت کارکنان ممنوعیت ورود همراهان را دلیل پایین بودن آمار خشونت می‌دانستند (۲۶) در این راستا در مطالعه‌ای که همدان و حمرا در فلسطین انجام دادند بر این باور بودند که افزایش امنیت بخش اورژانس از طریق افزایش کارکنان امنیتی، وجود زنگ‌های هشداردهنده و دوربین مداربسته می‌تواند در کنترل خشونت کمک کننده باشد (۴۶).

جدول شماره ۱: ویژگی‌های مطالعات صورت گرفته در خصوص خشونت علیه پرستاران اورژانس و عوامل مرتبط با آن

نتایج	ابزار	روش نمونه‌گیری / تعداد نمونه	نوع پژوهش	هدف مطالعه	نویسنده/زمان / محل مطالعه
پس از آموزش، میزان گزارش دهی خشونت افزایش یافت و کارکنان ادعا نمودند محیط امن تر دارند.	پرسشنامه	۱۵۴ نفر در مرحله ابتدایی/۲۰۰ نفر پیگیری یک سال بعد	مداخله‌ای	بررسی خشونت در اورژانس و تعیین تأثیر آموزش در افزایش گزارش دهی خشونت	استین و همکاران/ ۲۰۱۵ روچستر
بیشتر سن میزان خشونت به ترتیب شامل کلامی، فیزیکی، تهدید کلامی بود. بیشترین عامل خشونت از جانب همراهان بود.	پرسشنامه پژوهشگر ساخته دو قسمی	تمام شماری/ ۱۲۰ نفر	توصیفی - مقاطعی	بررسی خشونت علیه پرستاران در بخش‌های اورژانس مراکز آموزشی درمانی ارومیه	سهیلی و همکاران ۱۳۹۲/ ارومیه
۹۶٪ پرستاران در طول دوره کاری خود مورد خشونت قرار گرفته بودند. خشونت علیه پرستاران مرد بیشتر از پرستاران زن بوده است. همچنین بیشترین عامل خشونت علیه پرستاران، خشونت کلامی بوده و بیشترین علت و عامل محرك بروز خشونت شلوغی و ازدحام در استگاه پرستاری بوده است.	پرسشنامه استاندارد شده خشونت محل کار در واحدهای سلامت مشتمل بر ۴ قسمت	تمام شماری/ ۵۲ نفر	توصیفی - تحلیلی	بررسی علل و راهکارهای خشونت در محیط کار پرستاران شاغل در اورژانس یمارستان‌های منتخب آموزشی همدان	ایمنی و همکاران ۱۳۹۲/ همدان
بیشترین نوع خشونت به ترتیب کلامی، فیزیکی، تزادی و جنسی بود. بیشترین عوامل مؤثر در بروز خشونت، در دسترس بودن پرستار، نبود انگیزه و رضایت شغلی، تگرانی درباره سلامت بیمار بود.	پرسشنامه تعدلی شده سازمان جهانی بهداشت در زمینه خشونت محل کار در محیط‌های بهداشتی	در دسترس/ ۱۰۰ نفر	توصیفی - تحلیلی	بررسی عوامل مؤثر در اعمال خشونت علیه پرستاران اورژانس یمارستان‌های علوم پزشکی سبزوار	ده نبی و همکاران ۱۳۹۷ سبزوار
سوءاستفاده کلامی، تهدید و خشونت جسمی بیشترین شووع خشونت را نشان داد. شیفت شب، عدم مداخله پیس، ماندگاری بالای یمار به عنوان عوامل اصلی خشونت شناخته شد. در اکثر موارد پرستاران آموزش کافی در برخورد با خشونت را نمی‌دهند.	پرسشنامه	۱۰۱ نفر	توصیفی - مقاطعی	بررسی خشونت علیه پرستاران اورژانس جنوب ایران	لاlezاری و همکاران ۲۰۱۳/ بندرعباس
بیشترین عامل خشونت همراهان یمار، بیشترین زمان خشونت، شیفت شب، روزهای تعطیل و هنگام پذیرش یمار بوده است. بیشترین علل خشونت، عدم کنترل رفت و آمد همراهان به بخش اورژانس بوده است.	پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳ قسمت و ۴۲ سؤال	در دسترس/ ۱۰۰ نفر	توصیفی	بررسی موارد خشونت نسبت به پرستاران در بخش‌های اورژانس یمارستان‌های وابسته به دانشگاه تهران	مشتاق عشق و همکاران ۱۳۹۰ تهران
شیوع خشونت ۹۸/۶٪ بود که به ترتیب شامل خشونت کلامی، جسمی و سایر بود. دلایل کم گزارش دهی نیز اعتقاد به بی‌فایده بودن و اهمیت ندادن بود. از دلایل بروز خشونت نیز زمان طولانی انتظار در اورژانس، بالا بودن هزینه‌ها، کم بودن تعداد کارکنان بود.	پرسشنامه ۵ قسمتی	در دسترس/ ۱۳۶ نفر	مقاطعی	تعیین فراوانی خشونت علیه کارکنان پرستاری شاغل در اورژانس یمارستان‌های تهران	سلیمانی و همکاران ۱۳۸۵ تهران
خشونت با سن، سابقه کاری، تأهل، تحصیلات، شیفت کاری، ایام تعطیلات ارتباطی نداشت اما با جنس مذکور، شیفت شب، همراهان مذکور، هوشیار بودن یمار رابطه معناداری داشت.	پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲ قسمت و ۱۷ سؤال	سرشماری/ ۱۳۸ نفر	توصیفی - مقاطعی	تعیین فراوانی و ویژگی‌های خشونت علیه کارکنان پرستاری اورژانس یمارستان‌های آموزشی رشت	دهنادی مقدم و همکاران ۱۳۹۱ ارشاد ت
۷۶/۹ درصد پرستاران تجربه خشونت داشتند. ۴۵/۷ درصد پرستاران سطح زندگی کاری پایین داشتند. بین تجربه خشونت محل کار و کنیت کاری پرستاران رابطه معکوس وجود دارد.	پرسشنامه ۳ قسمتی	۱۸۶ نفر	توصیفی - همبستگی	بررسی رابطه خشونت محل کار با کیفیت کاری پرستاران اورژانس	اسلامیان و همکاران ۱۴۰۵ اصفهان

نتایج	ابزار	روش نمونه‌گیری / تعداد نمونه	نوع پژوهش	هدف مطالعه	نویسنده/زمان / محل مطالعه
تمام شرکت کنندگان در مطالعه اظهار داشتند که به طور مرتب با خشونت مواجه هستند که شامل هم خشونت کلامی و هم فیزیکی می‌شود که این با یافته‌های گزارش‌ها بیمارستانی کمی مغایر بود.	پرسشنامه	نفر ۳۴	مولتی متدا	تعیین میزان خشونت محل کار در بخش اورژانس و در که پرستاران از آن	هایلند و همکاران ۲۰۱۶/ آسیدنی
نتایج تأیید می‌کند که خشونت بیمار نسبت به پرستاران منجر به خشونت پرستاران نسبت به بیماران می‌شود.	پرسشنامه شامل دو قسمت	۲۵۰ نفر	طبقه‌بندی شده	بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با خشونت	حافظ و همکاران پاکستان ۲۰۱۸/
پرستاران کم سابقه‌تر در معرض خشونت بیشتری قرار دارند. به اعتقاد اکثربت پرستاران خشونت باعث کاهش بهره‌وری می‌گردد.	پرسشنامه محقق ساخته	تمام شماری ۱۳۴ نفر	- توصیفی- مقاطعی همبستگی	بررسی خشونت و تأثیر پیشگیری بر بهره‌وری پرستاران و ارتباط آن با عوامل شخصی و سازمانی	النیش و همکاران امان ۲۰۱۹/
۷۹٪ مورد خشونت کلامی، ۵۶٪ خشونت فیزیکی گزارش شد. ۴۲ نفر از مهاجین تحت تأثیر الكل بودند. ۲۹ نفر مبتلا به اختلالات روان پزشکی بودند. مهاجران به دلیل تعداد مراجعه بیشتر در گیر اورژانس هستند.	بررسی گزارش‌ها خشونت	۸۳ مورد خشونت گزارش شده	- توصیفی گذشتہ گر	بررسی خشونت کلامی و غیر کلامی در اورژانس دانشگاه سوئیس	کیزر و همکاران سوئیس ۲۰۱۸/
۱۰٪ پرستاران تجربه خشونت فیزیکی داشتند که بیشتر توسط بیماران اعمال شده بود. ۵۵٪ عنوان کردند جهت گزارش خشونت حمایت نشدن؛ و ۱۰٪ درصد گزارش کردند که هیچ اطلاعات یا آموزشی در مورد خشونت محل کار ندارند.	پرسشنامه سازمان چهانی بهداشت در زمینه خشونت محل کار	۱۶۹ نفر	- توصیفی و رگرسیون لجستیکی	تعیین تجربه بروز خشونت علیه پرستاران اورژانس	نورانی زهراء اندونزی ۲۰۱۸/
نتیجه مطالعه نشان‌دهنده میزان بالای خشونت علیه کارکنان پرستاری می‌باشد. نکته نگران‌کننده این است که کمتر از یک‌سوم پرستاران درخصوص مدیریت خشونت آموزش دیدند.	پرسشنامه pop اصلاح شده as (Perception of Prevalence of Aggression Scale)	۸۰/ تمام شماری	مقاطعی	شناسایی حوادث خشونت‌آمیز و پرخاشگری در اورژانس	رایان و مک‌گوایر ۲۰۰۶/ ایرلند

References

- Imani B, Nazari L, Majidi L, Zandieh M, Tajobi M. Investigation of the causes and solutions to violence in the workplace, emergency nurses in selected hospitals of Hamadan University of Medical Sciences. Pajouhan Scientific Journal. 2014;12(2):64-74.
- Soheili A, Habibzadeh H, Jafarizadeh H, Mohamadpor Y, Mehryar H, Rahmani A. Violence against nurses in emergency departments of Urmia university hospitals in 2013. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2014;12(9):874-882.
- Babaei N, Zirak M, Rahmani A, Avazeh M, Dadashzadeh A. Identifying and comparing the viewpoints of nurses & patients on workplace violence against nurses & related factors. Iranian Journal of Forensic Medicine. 2016;22(3):203-310.
- Zafar W, Siddiqui E, Ejaz K, Shehzad MU, Khan UR, Jamali S, et al. Health care personnel and workplace violence in the emergency departments of a volatile metropolis: results from Karachi, Pakistan. The Journal of emergency medicine. 2013;45(5):761-772.
- World health organization. World Report on Violence and Health. Geneva: WHO; 2002. available from : http://www.who.int/violence_injury_prevention(Accessed 8 July 2012).
- Salavati S SP, Aradoi Z, Tabesh H, Daraie M. Workplace violence against nurses in Ahvaz Educational Hospitals.

- The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015;12(11):1018.
7. Harorani M, Varvanifarhani P, Yazdanbakhsh SA, Pakniyat AG, Sadeghi H, Norozi M, et al. Evaluation of the Vulnerable Factors of Occupational Violence against Practitioner Medical Personnel in the Emergency Units of the Training Hospitals of Arak City. *Medical Ethics Journal*. 2017;11(39):55-61.
 8. Eslamian J, Akbarpoor AA, Hoseini SA. Quality of work life and its association with workplace violence of the nurses in emergency departments. *Iranian journal of nursing and midwifery research*. 2015;20(1):56.
 9. Cezar ES, Marziale MHP. Occupational violence problems in an emergency hospital in Londrina, Paraná, Brazil. *Cadernos de saude publica*. 2006;22(1):217-221.
 10. Samir N, Mohamed R, Moustafa E , Abou Saif H. Nurses' attitudes and reactions to workplace violence in obstetrics and gynaecology departments in Cairo hospitals. 2012.
 11. Shi L, Zhang D, Zhou C, Yang L, Sun T, Hao T, et al. A cross-sectional study on the prevalence and associated risk factors for workplace violence against Chinese nurses. *BMJ open*. 2017;7(6):e013105.
 12. Al-Ghabeesh SH, Qattom H. RETRACTED ARTICLE: Workplace bullying and its preventive measures and productivity among emergency department nurses. *Israel Journal of Health Policy Research*. 2019;8(1):44.
 13. Rahman HA, Abdul-Mumin K, Naing L. Psychosocial work stressors, work fatigue, and musculoskeletal disorders: comparison between emergency and critical care nurses in Brunei Public Hospitals. *Asian nursing research*. 2013;1(11):17-18.
 14. Basfr W, Hamdan A, Al-Habib S. Workplace violence against nurses in psychiatric hospital settings: perspectives from Saudi Arabia. *Sultan Qaboos University Medical Journal*. 2019;19(1):19-25.
 15. Najafi F, Fallahi-Khoshknab M, Dalvandi A ,Ahmadi F, Rahgozar M. Workplace violence against Iranian nurses: A systematic review. *Journal of health promotion management*. 2014;3(2):72-85.
 16. Ramacciati N, Ceccagnoli A, Addey B, Rasero L. Violence towards emergency nurses. The Italian national survey 2016: A qualitative study. *International journal of nursing studies*. 2018;81:21-29.
 17. Laeeque SH, Bilal A, Hafeez A, Khan Z. Violence breeds violence: burnout as a mediator between patient violence and nurse violence. *International journal of occupational safety and ergonomics*. 2019;25(4):604-13.
 18. Niu S-F, Lee T-Y, Tsai J-C, Hsing S-C, Wu S-C, Kao C-C. Workplace violence against nurses in northern Taiwan: a cross-sectional study. *Hu Li Za Zhi*. 2018;65(6):44-54.
 19. Babayi N RA, Mohajjel-aghdam A , Zamanzadeh V, Dadashzadeh A, , Avazeh M. Perception of patients' companions about nature of workplace violence against nurses in tabriz medical educational centers. *IJFM*. 2014;20(3):111-118.
 20. Gholaamzade-Nikjo R, Sahebi L. Workplace violence on clinical workers in Tabriz educational hospitals. *Zahedan Journal of Research in Medical Sciences*. 2012;13(10):40.
 21. Talas MS, Kocaöz S, Akgüç S. A survey of violence against staff working in the emergency department in Ankara, Turkey. *Asian nursing research*. 2011; 4(5): 197-203.
 22. Marx JA HR, Walls RM. Rosen's. Emergency medicine: Concepts and clinical practice. 6th. 2006:282-289.
 23. Kansagra SM, Rao SR, Sullivan AF, Gordon JA, Magid DJ, Kaushal R, et al. A survey of workplace violence across 65 US emergency departments. *Academic Emergency Medicine*. 2008;15(12):1268-1274.
 24. Ramacciati N, Ceccagnoli A, Addey B, Lumini E, Rasero L. Violence towards emergency nurses: A narrative review of theories and frameworks. *International emergency nursing*. 2018;39:2-12.
 25. Hasani A, Zaheri M, Abbasi M, Saeedi H, Hosseini M, Fathi M. Incidence Rate of physical and verbal violence inflicted by patients and their companions on the emergency department staff of Hazrate-e-Rasoul hospital in the fourth trimester of the year 1385 .*Razi Journal of Medical Sciences*. 2010;16:46-51.
 26. Dehnadi-Moghaddam A, Asghazadeh A, Hosseini S, Kouchakinejad-Erampsadati L, Kazemnejad-Leili E, BagherniaHemmati N. Frequency and characteristics of violence against

- nurses of emergency departments. J Ardabil Nurs Faculty. 2013;14(4):62-68.
27. KAESER D, GUERRA R, KEIDAR O, LANZ U, MOSES M, KOBEL C, et al. Verbal and non-verbal aggression in a Swiss university emergency room: a descriptive study. International journal of environmental research and public health. 2018;15(7):1423.
 28. ZAHRA AN, FENG J-Y. Workplace violence against nurses in Indonesian emergency departments. Enfermeria clinica. 2018;28:184-190.
 29. HYLAND S, WATTS J, FRY M. Rates of workplace aggression in the emergency department and nurses' perceptions of this challenging behaviour: A multimethod study. Australasian emergency nursing journal. 2016;19(3):143-148.
 30. MOSHTAQ EZ, SAEEDI M, ABEDSAEEDI Z, ALAVIMAJID H, NAJAFI AZ. Violence toward nurses at emergency rooms (ERs) of hospitals of Medical Universities in Tehran. Faculty of nursing of midwifery quarterly. 2012;22(77):32-38.
 31. SALIMI J, EZAZI ERDI L, KARBAKHSH DAVARI M. Violence against nurses in non-psychiatry emergency wards. Iranian Journal of Forensic Medicine. 2007;12(4):202-209.
 32. DEHNABI A, RADSEPEHR H, DEHNABI A. Investigating the Factors Affecting Violence against Emergency Nurses in Sabzevar Medical Sciences Hospitals. occupational hygiene and health promotion journal. 2018;2(1):51-61.
 33. LALEZARI M, HAGHIRIDEHBAREZ A, YAZDANI R, JAFARIYAN F. Investigation of violence against emergency nurses in a referral university hospital in Southern Iran. Hormozgan medical journal. 2014;18(4):323-330.
 34. HEMATI ESMAEILI M HNF, REIHANI HR. Evaluation of violence of patients and their families against emergency nurses. Iran J Crit Care Nurs. 2015;7(4):227-236.
 35. RYAN D, MAGUIRE J. Aggression and violence—a problem in Irish Accident and Emergency departments? Journal of nursing management. 2006;14(2):106-115.
 36. STENE J, LARSON E, LEVY M, DOHLMAN M. Workplace violence in the emergency department: giving staff the tools and support to report. The permanente journal. 2015;19(2):e113.
 37. GILCHRIST H, JONES SC, BARRIE L. Experiences of emergency department staff: Alcohol-related and other violence and aggression. Australasian emergency nursing journal. 2011;14(1):9-16.
 38. RICHARDSON SK, GRAINGER PC, ARDAH MW, MORRISON R. Violence and aggression in the emergency department is under-reported and under-appreciated. NZ Med J. 2018;131(1476):50-58.
 39. PURAGHAEI M, TABRIZI JS, GHAMI R, ELMIDUST N. Study of Risks in emergency department at Tabriz Imam Reza hospital. medical journal of mashhad university of medical sciences. 2015;58(6):302-309.
 40. KUHPAYEHZADEH J HMP, IMANIZADEH Z, DANESH H, DARYAZADEH S. Effect of communication skills over emergency department personnel in verbal and physical violence event. Razi Journal of Medical Sciences. 2014;21(124):61-68.
 41. MAZLOM S, TASEERI A. The Effect of workplace violence prevention program on attitudes of nurses towards the management of violence and aggression in patients and their families. Journal of Health Promotion Management. 2015;4(1):80-87.
 42. DAS G, AVCI IA. The effect of anger management levels and communication skills of Emergency Department staff on being exposed to violence. Med Glas (Zenica). 2015;12(1):99-104.
 43. SABERI H, SOHEILI A. Prediction of Level of Aggression and Interpersonal Problems in ED nurses based on their Occupational Stress. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2017;15(6):478-487.
 44. FATHI ASHTIANI A, PIRZADI H, SHOKOOGHI-YEKTA M, TAVALLAI S. The Influence of Teaching Program of Stress Management and Communication Skills on Improvement of Mental Health of Nurses and Hospital Staff: An Experimental Study. Iran Journal of Nursing. 2014;27(90):1-13.
 45. MORKEN T, JOHANSEN IH, ALSAKER K. Dealing with workplace violence in emergency primary health care: a focus group study. BMC family practice. 2015;16(1):51-57.
 46. HAMDAN M. Workplace violence towards workers in the emergency departments of Palestinian hospitals: a cross-sectional study. Human resources for health. 2015;13(1):28-35.